

LA PIEL ASIENTO DE LINFOMAS B

R. Carreño, M. Barbón, E. de cabo, A.M Ojea, M.J. Moro.

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de León

Introducción: A partir de una serie de cinco pacientes diagnosticados de Linfoma no Hodgkin B de célula grande cutáneo entre los años 1.999 y 2.006, pretendemos ofrecer una visión de cual es la actitud terapéutica y posterior evolución de éstos en nuestro centro.

Descripción: Para el estudio de estos linfomas de exclusiva localización cutánea hemos recogido datos demográficos como la edad y el sexo, clínico-biológicos como la #b2 microglobulina y LDH junto a organomegalias y/o adenopatías así como los tratamientos administrados con sus respectivas respuestas y duración de las mismas.

Caso	1	2	3	4	5
Edad al Dx	72	89	49	36	50
Sexo	V	M	V	V	V
Dx	LNH B CG cutáneoCD20+	LNH B CG cutáneoCD20+, cél. T	LNH B CG cutáneoCD20+	LNH B CG cutáneo	LNH B CG cutáneo
Localización	Cuero cabelludo	Párpado izdo.	Cuero cabelludo	Brazo izdo.	Temporal izdo.
Fecha Dx	Feb. 2002	Feb. 2005	May. 2000	Mar. 1999	Nov. 1999
Órganomegal	No	No	No	No	No
Adenopatías	No	No	No	No	No
#b ₂ #m/LDH Dx	1.6 / 374	3.39 / 470	1.3 / 212	1.5/ 344	1.3 / 280
#b ₂ #m/LDH último	3.67 / 350	4.11 / 499	1.99 / 299	1.5/ 403	1.81 / 374
Tto. / Respuesta	0 / Regresión espontánea	1º)Qx+Cy→NR 2º)R(x4)→NR 3º)CHOP(x1)+ RT→NV	Qx+CHOP(x6)+ RT ↓ RC	Qx+ CHOP(x6) ↓ RC	RT ↓ RC
Efectos Adversos	-	No	No	Vómitos grado 2	Dermatitis post-RT
Tº libre enf.	5	-	7	8	7
Estado actual	RC	Pérdida de seguimiento	RC	RC	RC

R→ Rituximab. Cy→ Ciclofosfamida. Qx→ cirugía. RT→ radioterapia. RC→ remisión completa. NR→ no respuesta. NV→ no valorable. Dx→ diagnóstico. Tº→ tiempo.

Conclusión: Tratándose de una serie corta de casos, no podemos elaborar un protocolo de actuación, pero sí destacar algunos aspectos interesantes como que: 1. En 4 de los 5 pacientes la lesión se localizó en la cabeza. 2. La relación V/M fue 4/1. 3. En el caso en el que no se obtuvo respuesta la #b₂#m siempre estuvo en rango patológico. 4. Las RC fueron tras una sola línea de Tto, siendo ésta diferente en los 3 casos, alcanzándose largos periodos libres de enfermedad.