

BENDAMUSTINA EN PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE REFRACTARIO O EN RECIDIVA. EXPERIENCIA PRELIMINAR Y PROPUESTA DE UN REGISTRO DE USO COMPASIVO

I. Vicuña, B. Aguado, S. Martínez, M. Roig, M. Cuadrado, M. Subero, J. Cartier, J. Lahuerta, M. Hernández, A. Alegre
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

bendamustina es un agente alquilante dual con eficacia demostrada en MM *de novo* y en MM R/R. Presentamos los resultados preliminares del uso compasivo de este agente y proponemos un registro multicéntrico de uso compasivo de Bendamustina en MM R/R a través del Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA).

Pacientes y métodos: 9 pacientes con MM R/R tras varias líneas de tratamiento previas recibieron un esquema que contenía Bendamustina. Mediana de edad 67 (35-68) todos con TASPE previo y una mediana de 5 líneas de rescate previas (3 – 7). La dosis de Bendamustina utilizada varió entre 90 y 180 mg/m² i.v por ciclo. La mediana de ciclos fue de 3 (2-4). La combinación fue de Bortezomib y dexametasona en 5 casos, dexametasona sola en 1 y MP en 3 casos.

Resultados: De 7 pacientes evaluables 2 obtuvieron RP (28%) de duración de 4 y 6 meses y 2 EE (28%). El resto progresó y falleció en el seno de tratamiento. En general el tratamiento fue muy bien tolerado, siendo la toxicidad hematológica efecto adverso más frecuente.

Comentarios: El tratamiento con bendamustina en pacientes con MM R/R puede suponer una alternativa terapéutica aunque quizás en etapas más precoces por los resultados observados. Se precisa mayor experiencia con este agente y encontrar la mejor combinación. Se ha iniciado un Registro de multicéntrico de uso compasivo a través del GEM (estudio transversal) que será presentado en este congreso.